



www.tnparia.com
info@tnparia.com

ضد عفونی کننده Disinfectant

■ ویراکیل (Virakill™)

ویراکیل ضد عفونی کننده‌ای با فرمول انحصاری، پیشرفته و جدید، از ترکیبات آمونیوم چهارتایی از شرکت ICA را دارد. آفریقای جنوبی است، که ماده مؤثره آن دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، به میزان ۱۲۰ گرم در لیتر می‌باشد.

■ ویژگی‌های ویراکیل

- مؤثر بر روی طیف وسیعی از ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها، مخمر، جلبک و گونه‌های میکوبیاسما
- **توجه:** ویروس‌های بدون دیواره (مثل ویروس گامبورو) که نسبت به ضد عفونی کننده‌ها مقاوم‌اند، را نیز از بین می‌برد.
- عوارض کمی برای محیط زیست دارد و به راحتی تغییر ماهیت می‌دهد.
- اکسید نمی‌شود و خوردگی ایجاد نمی‌کند.
- در دوزهای توصیه شده، غیر سمی بوده، بطوریکه برای جوجه یک روزه نیز قابل مصرف است.
- کاملاً در برگیرنده است و سطوح را به خوبی خیس کرده و قدرت نفوذ زیادی دارد.
- در حضور مواد آلی فعال است و سختی و سنگینی آب بر عملکرد آن، تأثیر نمی‌گذارد.
- به تغییرات pH حساس نیست و در محدوده گسترده‌ای از دما و pH فعال است.
- قابلیت اسپری مستقیم روی پرند را دارد.
- بدون بو و بدون رنگ است.
- استفاده منظم از ویراکیل، جمعیت باکتری‌های داخل نای پرند را، به طور متوسط ۷۰٪ کاهش می‌دهد.
- مه‌پاشی دورهای ویراکیل (۳-۲ بار در هفته)، به صورت قابل توجهی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری را، در فارم‌های گوشتی و تخم‌گذار کاهش می‌دهد.
- بررسی مقایسه‌ای ویراکیل نشان داده که ضد عفونی با ویراکیل، ۷۰٪ برابر مؤثرتر از محصولات مشابه عمل می‌کند.
- مصرف چند جانبه ویراکیل (شستشو، ضد عفونی، استفاده در آب آشامیدنی و مه‌پاشی دورهای) در کاهش سرعت شیوع بیماری‌های مسری بسیار مؤثر است.
- ویراکیل بسیاری از بیماری‌ها از جمله گامبورو، آنفلوآنزا، برونشیت، نیوکاسل و اسهال‌های ناشی از E.coli و سالمونلا را، کنترل می‌کند.

■ توصیه‌های ایمنی

- قبل از مصرف، گالن را تکان دهید.
- برای ماهی و دیگر آبزیان سمی است.
- از تماس با چشم و پوست خودداری شود.
- ۲۴ ساعت قبل و بعد از واکسیناسیون، استفاده نشود.
- امکان جایگزینی ویراکیل به جای واکسیناسیون وجود ندارد.
- در حین اسپری از ماسک، دستکش پلاستیکی، عینک ایمنی و لباس مناسب استفاده شود.
- بعد از استفاده، مه‌پاش را کاملاً آبکشی کرده و از ریختن باقیمانده محلول در رودخانه، مزارع و مراتع خودداری کنید.



Made in
SOUTH AFRICA





موارد، میزان و نحوه مصرف

موارد استفاده	میزان مصرف	توصیه های کاربردی
شستشوی سطوح	۲۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	۱ - ۵٪ لیتر از محلول را برای هر متر مربع به کار برده سپس بعد از ۵٪ تا ۱ ساعت بشویید.
ضد عفونی محل نگهداری کلیه حیوانات (سالن مرغداری، لانه سگ، گاوداری و امثال) همه سطوح، تجهیزات، جوجه کشی ها، ظروف و ابزارآلات	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	به ازای هر متر مربع ۴۰۰ - ۳۰۰ میلی لیتر از محلول را به کار برده، سپس اجازه دهید خشک شود. (ضد عفونی بایستی ۲۴ ساعت قبل از ورود حیوان به سالن صورت پذیرد).
حوضچه های ضد عفونی	۱ لیتر در ۲۵ تا ۵۰ لیتر آب	هر ۳ - ۲ روز یکبار، در صورت کدر شدن آب را تعویض کنید.
ضد عفونی آب آشامیدنی پرندگان	۱۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	به صورت مداوم و یا در زمان شیوع بیماری استفاده شود.
ضد عفونی هوا قبل از ورود حیوان به سالن	مه پاشی سرد: ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	مه پاشی سرد: ۱۴ لیتر از محلول برای ۱۰۰۰ متر مکعب به کار ببرید.
	بخاردهی: ۳ لیتر در ۲ تا ۴ لیتر آب	بخاردهی: این میزان را برای ۱۰۰۰ متر مکعب به کار ببرید.
ضد عفونی هوا در خلال پرورش	۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب (۱ تا ۳ بار در هر روز)	مرغ گوشتی: بهتر است مه پاشی سرد شود. مرغ تخم گذار: بهتر است اسپری شود. (۱ میلی لیتر برای هر سر مرغ)
ضد عفونی تخم مرغ های جوجه کشی	۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	محلول با تخم مرغ های جوجه کشی هم دما باشد.
ضد عفونی کننده دستگاه شیر دوش	۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	ضد عفونی دستگاه شیر دوش (حتما پس از مصرف، آبکشی شود)
	۴ تا ۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	در صورت وجود قطعات چربی

تک نام

شرکت تک نام پندار آریا

تهران، صندوق پستی ۳۱۴ - ۱۶۷۶۵
تلفن: ۴۳ - ۷۰ ۲۲ ۹۷ (۰۲۱)
موبایل: ۹۲۰ ۸۸۲ ۵۶ ۲۶

0920 882 56 26

taknampendararia

www.tnparia.com

info@tnparia.com



www.tnparia.com
info@tnparia.com

مولتی آنزیم Multi Enzyme

آنزیم‌های موجود در مولتی آنزیم ناتوزیم P و P50 (آنزیم ۱۳ گانه سبز)

Phytase	تجزیه فیتات‌ها و آزاد کردن ذخایر فسفر در فیتات‌ها	فیتاز
Beta Glucanase	تجزیه بتاگلوکان‌ها و کاهش ویسکوزیته داخلی دستگاه گوارش	بتاگلوکاناز
Alpha Amylase	تجزیه نشاسته به گلوکز و مالتوز	آلفا آمیلاز
Cellulase	تجزیه سلولز	سلولاز
Hemi Cellulase	تجزیه همی سلولز	همی سلولاز
Pectinase	تجزیه پکتین‌ها	پکتیناز
Amyloglycosidase	تجزیه نشاسته و تولید گلوکز	آمیلوگلیکوزیداز
Xylanase	تجزیه آرابینوزایلان‌ها و کاهش ویسکوزیته داخلی دستگاه گوارش	زایلاناز
Protease	تجزیه پروتئین‌ها و کاهش دفع نیتروژن	پروتئاز
Pentosanase	تجزیه پنتوزان‌ها	پنتوزاناز
Lipase	کمک به هضم چربی‌ها	لیپاز
Acid Phosphatase	کمک به جذب فسفر	اسید فسفاتاز
Acid Phytase	کمک به جذب فسفر	اسید فیتاز

Natuzyme
P

Natuzyme
P50

Natuphyt
10000



میزان مصرف

آنزیم	دام
ناتوزیم P	۱۰۰۰ - ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک یا ۲۰ گرم به ازای هر رأس در روز
ناتوزیم P50	۱۴۳ - ۷۰ گرم در هر تن خوراک یا ۳ گرم به ازای هر رأس در روز



میزان مصرف

آنزیم	طیور گوشتی	طیور تخم‌گذار و مادر
ناتوزیم P	۳۵۰ گرم در هر تن خوراک	۲۵۰ گرم در هر تن خوراک
ناتوزیم P50	۵۰ گرم در هر تن خوراک	۳۵ گرم در هر تن خوراک
ناتوفیت 10000	۵۰ گرم در هر تن خوراک	۳۰ گرم در هر تن خوراک



میزان مصرف

آنزیم	آبزیان
ناتوزیم P	۳۵۰ گرم در هر تن خوراک
ناتوزیم P50	۵۰ گرم در هر تن خوراک
ناتوفیت 10000	۵۰ گرم در هر تن خوراک

0920 882 56 26

taknampendararia

www.tnparia.com

info@tnparia.com

تک نام

شرکت تک نام پندار آریا

تهران، صندوق پستی: ۳۱۴ - ۱۶۷۶۵

تلفن: ۰۲۱ - ۲۲ ۹۷ ۷۰ ۴۳ - ۶

موبایل: ۰۹۲۰ ۸۸۲ ۵۶ ۲۶





www.tnparia.com
info@tnparia.com

مولتی آنزیم Multi Enzyme

ویژگی‌های ناتوزیم P و P50 بر روی جیره‌های طیور

- قابلیت پلت شدن و تحمل حرارت، بطوری که تحمل حرارت بالا (۹۵ - ۹۰ °C) بدون افت کیفیت را دارد.
- مؤثر بر روی انواع جیره‌های بر پایه ذرت، انواع کنجاله‌ها (سویا، آفتابگردان، کلزا و تخم پنبه)، گندم، جو، سبوس (گندم و برنج)، سورگوم و تمام مواد ارزان قیمت مجاز برای خوراک طیور.
- افزایش قابلیت دسترسی به اسیدهای آمینه در خوراک (افزایش جذب لیزین، متیونین، ترئونین و پروتئین خام).
- تولید زیاد انرژی: از طریق آزادسازی انرژی‌های غیر قابل دسترس در خوراک و کاهش نیاز به افزودن چربی و روغن به عنوان منبع انرژی و در نتیجه کاهش ارزش ریالی دان.
- دوستدار محیط زیست: به دلیل وجود فیتاز، می‌توان ۱/۰٪ از فسفر (یا معادل ۷ - ۶ kg از دی کلسیم فسفات در هر تن جیره) را کاهش داد که علاوه بر کاهش هزینه و ارزان‌تر شدن دان، دفع کمتر فسفر و نیتروژن در مدفوع را سبب شده و آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌شود.
- افزایش سلامتی: ناتوزیم با عملکرد خود باعث کاهش ویسکوزیته محتویات دستگاه گوارش و تنظیم سرعت عبور دستگاه گوارش می‌شود. جذب بهتر غذا در قسمت‌های بالای دستگاه گوارش، باعث شده تا غذای لازم برای رشد و تکثیر میکروب‌های مضر در انتهای دستگاه گوارش موجود نباشد و بدین وسیله تعداد میکروب‌ها در دستگاه گوارش کاهش می‌یابد.
- بهبود ضریب تبدیل (FCR): به دلیل هضم و جذب بهتر مواد غذایی، تحریک رشد و بهبود ضریب تبدیل را سبب شده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های خوراک و بهبود حفظ و نگهداری گله می‌شود.
- خشکی بستر و کاهش میزان آمونیاک در سالن: که به دلیل کاهش دفع آب در مدفوع بوده و سبب کاهش ویسکوزیته مدفوع و نیز تمیزتر ماندن پوسته تخم مرغ‌ها می‌شود.

فواید استفاده از ناتوزیم P و P50 در نشخوارکنندگان

- افزایش راندمان تولید: به دلیل بهبود مصرف مواد فیبری، افزایش قابلیت هضم و در نهایت افزایش راندمان تولید شیر از ۱۰٪ - ۵٪.
- افزایش وزن زنده در پرواربندی: افزایش میانگین وزن روزانه به میزان حداکثر ۱۰٪ و بهبود ضریب تبدیل خوراک به میزان ۱۵٪.
- جلوگیری از اختلال در جذب: به دلیل هضم قندها به اندازه‌ای که توسط حیوان، قابل جذب باشد و جلوگیری از افزایش چسبندگی در محتویات هضمی به خصوص در حیوانات جوان.
- کاهش بالانس منفی انرژی در گاوهای تازه‌زا: به دلیل افزایش قابلیت هضم، سبب عملکرد بهتر دام در دورانی می‌شود که گاو شیری در تعادل منفی انرژی قرار دارد.

- تولید انرژی زیاد: آزادسازی انرژی‌های غیر قابل دسترس، سبب تولید انرژی بیش از حد معمول می‌شود.
- بالانس ارزان‌تر جیره: بهبود قابلیت هضم و جذب مواد مغذی و افزایش ارزش غذایی ضایعات مورد استفاده محلی و همچنین استفاده بهینه از گاه گندم در جیره گاوهای پرواری.

موارد استفاده ناتوزیم در دام

- گاوهای انتظارزایش
- گاوهای تازه‌زا
- گاو شیری
- گوساله‌های در حال رشد
- تلیسه‌ها
- گوساله‌های نر پرواری
- گوسفند
- بز

- بهبود اندیس لاشه: کاهش انباشت چربی در لاشه به دلیل وجود آنزیم لیپاز
- افزایش تولید شیر در گاوهای شیرده
- افزایش درصد چربی شیر
- کاهش هزینه‌های تولید
- بهبود مشکلات فحلی و افزایش پذیرش اسپرم
- رفع مشکل بقایای مواد خوراکی در مدفوع و بهبود اندیس مدفوع
- استفاده بهینه در جیره‌های آغازین و پیش آغازین گوساله‌های شیرخوار
- افزایش خوش خوراکی جیره
- کاهش احتیاجات دام به مکمل‌های فسفردار

ناتوفیت (Natuphyt 10000)

فیتاز خالص با منشأ میکروبی، که به صورت گرانول و مقاوم در برابر حرارت است. استفاده از ناتوفیت در جیره طیور، علاوه بر افزایش دسترسی به فسفر جیره، سبب آزادسازی انرژی بیشتر شده و مصرف روغن و چربی در جیره را کاهش می‌دهد. در صورت استفاده از ناتوزیم P و P50، نیازی به مصرف فیتاز اضافی نمی‌باشد.

فواید استفاده از ناتوزیم P و P50 در آبزیان

- بهبود قابلیت هضم و کاهش مواد دفعی و در نتیجه آلودگی کمتر استخرها
- بهبود ضریب تبدیل (FCR)
- افزایش قابلیت دسترسی به اسیدهای آمینه در خوراک
- تولید انرژی زیاد
- رشد بهتر و سریع‌تر
- سلامت گله و کاهش تلفات



Made in
AUSTRALIA

